

DIGESTAT®

Trimébutine maléate 200mg

ديجستات®

تريموبيتين ماليات 200مغ

FORME ET PRESENTATION

Comprimés blancs et gravés « LS », boîte de 30, sous plaquettes thermoformées.

COMPOSITION

Trimébutine maléate 20 mg
Excipients QSP 1 comprimé
Lactose Lactose

INDICATIONS

Traitement symptomatique des douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires. Traitement symptomatique des douleurs, des troubles du transit, de l'inconfort intestinal lié aux troubles fonctionnels intestinaux.

POSOLOGIE

La présentation à 200 mg doit être réservée à l'adulte aux cas exceptionnels ou la posologie de 600 mg par jour est utile, le traitement par ce médicament doit être de courte durée.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale. Le comprimé doit être avalé avec un verre d'eau.

CONTRE INDICATION

Ne pas prendre ce médicament en cas d'hypersensibilité connue à la trimébutine maléate et / ou à l'un des composants. Réservé à l'adulte, cette forme n'est pas adaptée au nouveau-né, au nourrisson et à l'enfant.

MISE EN GARDE ET PRECAUTION D'EMPLOI

Ce médicament contient du lactose comme excipient, son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase ou syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares)

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse :

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament au court du 1er trimestre de la grossesse. En l'absence d'effet néfaste attendu pour la mère et l'enfant, l'utilisation de ce médicament au cours des 2ème et 3ème trimestres de grossesse ne doit être envisagée que si nécessaire. Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur le conseil de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement :

L'allaitement est possible lors d'un traitement par trimébutine maléate.

EFFETS INDESIRABLES

A dose thérapeutique : des atteintes cutanées ont été rarement rapportées. En cas de surdosage : un traitement symptomatique sera à mettre en œuvre.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION

Uniquement sur ordonnance LISTE II.

CONDITION DE CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température inférieure à 25 °C.

شكل و تقديم
أقراص بيضاء مكتوب عليها رمز «LS» علبه 03 قرص

الترييب

تريموبيتين ماليات 20 مغ
سواغ لك.ك.ل 1 قرص
سواغ ذو تأثير ملحوظ لاكتوز

دواعي الاستعمال

علاج عرضي للألام الناجمة عن الاضطرابات الوظيفية للأنبوب الهضمي و قنوات الغدة الصفراوية. علاج عرضي للألام، انزعاجات و اضطرابات العبور المعوي الناجمة عن الاضطرابات الوظيفية للأمعاء.

الجرعة

يخصص هذا الدواء عيار 002 مغ للمبالغين في الحالات الاستثنائية حيث يوصى بمقدار يومي يصل إلى 006 مغ مدة العلاج بهذا الدواء تكون قصيرة.

كيفية و طريقة الاستعمال

عن طريق الفم. يجب ابتلاع الأقراص مع كوب من الماء.

موانع الاستعمال

- حساسية مفرطة للتريموبيتين ماليات أو لأحد المكونات.
- مخصص للكبار، هذا الشكل من الدواء (أقراص) غير مناسب للأطفال حليثي الولادة، الرضخ و الأطفال.

تحذيرات و احتياطات الاستعمال

- هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز كسواغ. لذا استعماله غير موصى به للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلاكتوز، إنزيم اللاكتاز أو نقص في متلازمة سوء امتصاص الغلوكوز أو الغلاكتوز (مرض وراثي نادر).

الحمل و الرضاعة

الحمل

من المستحسن عدم استعمال هذا الدواء خلال الثلث الأول من الحمل. بسبب عدم وجود آثار سلبية على الأم أو الطفل. يرجى توخي الحذر لدى استعمال هذا الدواء إذا لزم الأمر خلال الثلث الثاني و الثالث من الحمل. هذا الدواء لا يستعمل أثناء الحمل بدون نصيحة الطبيب. إذا اكتشف الحمل أثناء تعاطي هذا الدواء ينصح باستشارة الطبيب.

الرضاعة

يمكن استعمال هذا الدواء عند المرأة المرضعة.

التداخلات الدوائية

ينصح إبلاغ الطبيب أو الصيدلي عند تعاطي دواء آخر في نفس الوقت مع ديجيستات 200 مغ أو خلال فترة قريبة.

التأثيرات الجانبية

- الجرعة العلاجية: إصابات جلدية تظهر نادرا.
- الجرعة المفرطة: يجب وضع علاج عرضي.
- شروط الاستطباب: يصرف بوصفة طبية، قائمة 2.

شروط الحفظ

لا تتعدى تاريخ الصلاحية المكتوب على الغلاف الخارجي. يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة دون 25°م. لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

DE N° 14/10F 193/231

د.م.ت 14/10F 193/231



LABORATOIRES
SALEM

Détenteur de la DE, Fabricant, Conditionneur :
LABORATOIRES SALEM - Z.I. 19600EL-EULMA - ALGERIE
www.labosalem.com

حامل مقر التسجيل، مصنع، معين :
مخابر سالم - م.ص. 19600 العلما - الجزائر
www.labosalem.com

مخابر
سالم