

GLUCAR[®]

Acarbose 50 mg et 100 mg

FORMES ET PRÉSENTATIONS

GLUCAR 50 mg : Comprimés blancs, Boîte de 30

GLUCAR 100 mg : Comprimés sécables blancs, Boîte de 30

COMPOSITION

Acarbose (GLUCAR 50) 50 mg

Acarbose (GLUCAR 100) 100 mg

Excipients q.s.p. 1 comprimé

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétique

INDICATIONS

GLUCAR retarde la digestion et le passage du sucre dans le sang diminuant ainsi l'élévation du taux de sucre dans le sang qui survient après un repas. Il est utilisé pour traiter le diabète de "type 2" (diabète non insulino-dépendant), en complément du régime alimentaire, en monothérapie comme en association aux autres thérapeutiques antidiabétiques. Il est réservé aux adultes.

POSOLOGIE

En début de traitement, la dose initiale recommandée est de :

50 mg 3 fois par jour.

Ensuite et selon l'effet de ce médicament sur votre taux de sucre, votre médecin pourra adapter la dose.

En moyenne, la dose est de 300 mg par jour :

soit 1 comprimé de GLUCAR 100 mg 3 fois par jour,

ou 2 comprimés de GLUCAR 50 mg 3 fois par jour.

Dans quelques rares cas, votre médecin pourra décider d'augmenter la dose jusqu'à 600 mg par jour à répartir en 3 prises (soit au total 6 comprimés de GLUCAR 100 mg par jour).

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Ce médicament est utilisé par voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec un peu d'eau au début des repas ou croqués avec les premières bouchées.

CONTRE-INDICATIONS

- Allergique (hypersensible) à l'acarbose ou à l'un des composants de GLUCAR.

- Insuffisance rénale sévère.

- Insuffisance hépatique sévère.

- Problèmes digestifs majeurs (troubles chroniques de la digestion et de l'absorption, maladies inflammatoires de l'intestin, hernie intestinale majeure, obstruction intestinale, ulcération du colon).

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Suivre rigoureusement le régime alimentaire prescrit par votre médecin.

- Prévenir votre médecin si vous avez été opéré de l'abdomen.

- Si vous avez des troubles digestifs, parlez-en à votre médecin

- Si vous remarquez des symptômes aigus d'hypoglycémie : faiblesse, sueurs, fringale, tremblements, somnolence, vertige, maux de tête, troubles de la vue, prenez une boisson sucrée contenant du glucose ou à défaut plusieurs morceaux de sucre.

- Ce médicament peut induire une augmentation asymptotique des enzymes hépatiques, réversibles à l'arrêt du traitement.

- L'efficacité et la tolérance de ce médicament n'ont pas été établies chez l'enfant de moins de 18 ans.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

En cas d'association de GLUCAR avec un autre traitement antidiabétique, votre taux de sucre dans le sang après le repas pourrait être diminué de façon plus importante. Une adaptation de la posologie du traitement associé peut être nécessaire.

La mise à disposition de la digoxine (traitement de l'insuffisance cardiaque)

dans l'organisme peut être modifiée sous l'action du GLUCAR. Une adaptation de la posologie de la digoxine peut être nécessaire.

L'administration simultanée de la colestyramine, d'absorbants intestinaux ou de médicaments à base d'enzymes digestives doit être évitée (modification possible de l'activité de GLUCAR).

La prise concomitante de néomycine orale et GLUCAR, peut diminuer le taux de sucre dans le sang de façon plus importante.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse

Durant une grossesse, un diabète doit nécessairement être traité par de l'insuline.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte alors que vous prenez ce médicament, vous devez prévenir votre médecin. Celui-ci décidera d'interrompre ce traitement et de le remplacer par un traitement adapté à la grossesse.

Allaitement

Ce médicament n'est pas recommandé en cas d'allaitement

EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, GLUCAR comprimé peut avoir des effets indésirables, dont ne souffriront cependant pas nécessairement tous les patients.

Les indications de fréquence d'apparition des effets indésirables sont classées dans les catégories suivantes :

- Très fréquents : plus d'1 patient sur 10

- Fréquents : 1 à 10 patients traités sur 100

- Peu fréquents : 1 à 10 patients traités sur 1 000

- Rares : 1 à 10 patients traités sur 10 000

- Très rares : moins d'1 patient sur 10 000

- Fréquence non connue : Les données disponibles ne permettent pas de déterminer la fréquence d'apparition d'effets indésirables.

Effets indésirables digestifs

Les effets digestifs suivants s'améliorent généralement avec le temps :

- Très fréquent : gaz (flatulences),

- Fréquents : diarrhées, douleurs abdominales,

- Peu fréquents : nausées, vomissements, digestion difficile (dyspepsie).

Fréquence non reconnue : occlusion intestinale, pneumatose kystique intestinale

Si ces effets persistent, votre médecin pourra décider de diminuer temporairement ou définitivement la dose.

Effets indésirables hépatiques

Des réactions hépatiques réversibles à l'arrêt du traitement peuvent survenir :

- Peu fréquent : une augmentation des enzymes du foie,

- Rare : une jaunisse.

- Effets indésirables cutanés

- Fréquence non reconnue : des éruptions, des rougeurs et des plaques rouges qui démangent (urticaire).

Autres effets indésirables

- Fréquence non reconnue : diminution du nombre des plaquettes dans le sang (thrombocytopenie),

- Rare : œdème.

CONDITIONS DE CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25°C, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Date de péremption

Ne pas utiliser GLUCAR, comprimé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

DE N° : GLUCAR 50mg : 16/14A 136/231

GLUCAR 100mg : 16/14A 341/231

Date de révision de la notice : Octobre 2016

DE N° 16/14A 341/231

DE N° 16/14A 136/231

LABORATOIRES SALEM

Détenteur de la DE, Fabricant, Conditionneur :
LABORATOIRES SALEM - Z.I. 19600EL-EULMA - ALGERIE
www.labosalem.com



غلوكار[®]

أكاربوز 50 مغ، 100 مغ

شكل و تقديم

غلوكار 50 مغ : أقراص بيضاء، علبية تحوي 30 قرص.
غلوكار 100 مغ : أقراص قابلة للانقسام، بيضاء، علبية تحوي 30 قرص.

التركيب

أكاربوز (غلوكار 50) 50 مغ
أكاربوز (غلوكار 100) 100 مغ
سواغ ك ك ل 1 قرص
الفئة العلاجية : مضاد لدهاء السكري

دواعي الاستعمال

هذا الدواء يبطئ الهضم وامتصاص السكر عن طريق الأمعاء، مفعوله يؤخر مرور السكر في الدم مما يقلل من ارتفاع مستوى السكر في الدم الذي يحدث بعد تناول وجبة الطعام يستخدم لعلاج مرض السكري «نوع 2 غير المعتمد على الأنسولين» مكمل مع نظام غذائي. يستخدم وحده أو بالتزامن مع علاجات أخرى مضادة لدهاء السكري. هذا الدواء يستعمل للكبار فقط

المقادير

في بداية العلاج، الجرعة الموصى بها هي :
- 05 مغ 3 مرات في اليوم ثم اعتمادا على تأثير هذا الدواء على نسبة السكر في.
- الدم، فإن طبيبك يمكن أن يضبط الجرعة.
في المتوسط، الجرعة هي 300 مغ يوميا :
- إما قرص واحد من غلوكار 100 مغ 3مرات في اليوم،
- أو قرصين من غلوكار 05 مغ 3 مرات يوميا.
في حالات نادرة، قد يقرر الطبيب زيادة الجرعة إلى 600 مغ يوميا تقسم على 3 مرات (يوافق 6 أقراص من غلوكار 001 مغ)

كيفية و طريقة الإستعمال

هذا الدواء يستعمل عن طريق الفم، يجب ابتلاع الأقراص مع قليل من الماء في بداية الوجبة أو بمضغ مع بداية وضع الأكل في الفم.

موانع الاستعمال

- حساسية مفردة للكاربوز أو المكونات الأخرى للغلوكار.
- قصور كلوي حاد.
- قصور كبدي حاد.
- مشاكل في الجهاز الهضمي (اضطرابات مزمنة في الهضم و الامتصاص، التهاب الأمعاء، فتق الأمعاء، انسداد معوي، ثقرح القولون).

تحذير و احتياطات الاستعمال

- اتبع بدقة النظام الغذائي الذي يحدده الطبيب.
- أخبر طبيبك إذا كنت قد خضعت لعملية جراحية على مستوى البطن.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، تحدث بها طبيبك.
- عندما تلاحظ أعراض حادة لانخفاض نسبة السكر في الدم : الضعف، التعرق، جوع شديد، رعاش، نعاس، دوخة، صداع، عدم وضوح الرؤية، يؤخذ شراب محلى يحتوي على الغلوكار أو تناول عدة قطع من السكر.
- قد يسبب هذا الدواء في زيادة لا عرضية في إنزيمات الكبد، عكسية عند التوقف عن العلاج

لا يوجد معلومات عن فعالية وسلامة هذا الدواء عند الأطفال دون سن 18 عاما.

التداخلات الدوائية

إذا كنت تأخذ مضاد آخر لدهاء السكري بالتزامن مع غلوكار، يمكن أن ينخفض مستوى السكر في الدم إلى حد كبير بعد الوجبة. تعديل جرعة العلاج المتزامن قد

يكون ضروريا

توفر الديجوكسين في الجسم يمكن أن تتغير من خلال تأثير الغلوكار. تعديل في جرعة الديجوكسين قد تكون ضرورية.
ينبغي تجنب الأخذ المتزامن للكلوسترامين، المواد الماصة المعوية أو الأدوية المكونة من الانزيمات الهاضمة (احتمال تغيير في فعالية غلوكار).
قد يقلل الأخذ المتزامن لنيوميسين مع غلوكار من مستوى السكر في الدم بنسبة أكبر.

الحمل و الارضاع

الحمل

من الضروري علاج مرض السكري بالأنسولين خلال فترة الحمل. إذا اكتشفت أنك حامل أثناء فترة العلاج، يجب إخبار الطبيب بذلك هو الذي يقرر وقف هذا العلاج واستبداله بالعلاج المناسب للحمل.

الارضاع

لا ينصح هذا الدواء أثناء فترة الارضاع.

التأثيرات الجانبية

مثل جميع الأدوية، قد يسبب غلوكار قرص آثار جانبية، على الرغم من أن ليس جميع المرضى هم عرضة لهذه الأعراض.

يصنف تردد ظهور التأثيرات الجانبية إلى الفئات التالية :

- الشائعة جدا: أكثر من أعلى 10 مستخدم
- الشائعة : من 1 إلى 10 مستخدمين في 100
- قليلة الشيع : 1 إلى 10 مستخدمين في 1000
- النادرة : من 1 إلى 10 مستخدمين في 10000
- النادرة جدا : أقل من شخص في 10000

التردد غير معروف: البيانات المتاحة لا تحدد تردد وقوع التأثيرات الجانبية. التأثيرات على الجهاز الهضمي :

عادة ما تتحسن التأثيرات على الجهاز الهضمي مع مرور الوقت :

- الشائعة جدا : غاز (انتفاخ البطن).
- الشائعة : الإسهال، آلم في البطن.
- قليلة الشيع : الغثيان، التقيؤ، وعسر الهضم.
- التردد غير المعروفة: انسداد معوي، استرواح الأمعاء الكيسي.

إذا كنت هذه الآثار لا تزال قائمة، فإن طبيبك قد يقرر بصفة مؤقتة أو دائمة تقليل الجرعة.

التأثيرات على الكبد :

ردود الفعل الكبدية عكسية عند التوقف عن العلاج

- قليلة الشيع : زيادة في إنزيمات الكبد.
- النادرة : اليرقان.

التأثيرات على مستوى الجلد :

- التردد غير المعروفة: الطفح الجلدي، احمرار ويقع حمراء مع الحكمة.
- الآثار الجانبية الأخرى
- التردد غير معروف : انخفاض عدد الصفائح الدموية.
- النادرة : بوزمة.

شروط الحفظ

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة أقل من 25°م، بعيدا عن الحرارة والرطوبة

تاريخ الصلاحية

لا يستخدم غلوكار بعد تاريخ الصلاحية المكتوب على الغلاف الخارجي .

مقرر التسجيل رقم : غلوكار 50 مغ 16/14A 136/ 231

غلوكار 100 مغ 16/14A 341/ 231

تاريخ تحديث النشرة : أكتوبر 2016



حامل مقرر التسجيل، مصنع معين :
مخابر سالم - م.ص. 19600 العليمة - الجزائر
www.labosalem.com

مخابر
سالم

