

GLYCERINE LS®

Glycérol 1.80 g, 1.20 g, 0.72 g

FORME ET PRESENTATION

Boîte de 10 suppositoires translucides, sous plaquettes thermoformées.

COMPOSITION

Glycérol 1,80 g
ou 1,20 g
ou 0,72 g
Excipients q.s.p. 1 suppositoire

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Laxatif par voie rectale.

INDICATIONS

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de la constipation basse notamment par dyschésie rectale, ainsi que dans la préparation aux examens endoscopiques du rectum.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Le suppositoire peut être trempé dans l'eau froide pour en faciliter l'introduction par voie rectale.

Constipation : 1 suppositoire de GLYCERINE LS adulte 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour l'exonération, à renouveler dans la demi-heure ou l'heure qui suit en cas de constipation rebelle.

Enfant de 2 à 6 ans, 1 suppositoire de GLYCERINE LS Enfant 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour l'exonération.

Enfant de plus de 6 ans, 1 suppositoire de GLYCERINE LS Enfant 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour l'exonération, à renouveler éventuellement dans la demi-heure qui suit en cas de constipation rebelle.

la posologie dans le traitement de la constipation basse usuelle est d'un suppositoire GLYCERINE LS Bébé 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour l'exonération, avec interruption de 24 heures tous les 3 jours.

Examen endoscopique : La posologie dans la préparation aux examens endoscopiques du rectum est d'un suppositoire de GLYCERINE LS adulte 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour l'exonération.

Examen endoscopique : La posologie dans la préparation aux examens endoscopiques du rectum est d'un suppositoire de GLYCERINE LS adulte 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour l'exonération.

DUREE DE TRAITEMENT

Le traitement de la constipation ne doit pas, en moyenne, dépasser 10 jours.

CONTRE INDICATIONS

Ce médicament est contre-indiqué en cas de :

- Hypersensibilité au glycérol ou à l'un des autres composants.

- Colopathie obstructive, compte tenu de l'effet laxatif du médicament.

- Syndrome douloureux abdominal de cause indéterminée et inflammatoire (rectocolite ulcéreuse, maladie de CROHN).

MISES EN GARDE

- Une utilisation prolongée est déconseillée.

- Chez l'enfant, la prescription de laxatifs par voie rectale doit être exceptionnelle. Elle doit prendre en compte le risque d'entraver le fonctionnement normal du réflexe d'exonération.

- Le traitement médicamenteux de la constipation n'est qu'un adjuvant au traitement hygiéno-diététique.

- Enrichissement de l'alimentation en fibres végétales et en boissons.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser ce médicament dans les cas de crises hémorroïdaires, de fissures anales, de rectocolites hémorragiques et de maladie colique

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Absence de données cliniques. Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

Demander conseil à votre médecin ou pharmacien avant l'utilisation de ce médicament.

EFFETS INDESIRABLES

Un usage prolongé peut occasionner des sensations de brûlure anale et exceptionnellement des inflammations du rectum.

SURDOSAGE

En cas d'utilisation excessive ou prolongée, risque accru de rectites et de diarrhée. Arrêter le traitement ou diminuer la posologie. Il faut rétablir l'équilibre hydro électrolytique pour éviter la déshydratation.

CONDITION DE CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25 °C.

Ne jamais laisser ce médicament à la portée des enfants.

DATE DE MISE A JOUR DE LA NOTICE

juillet 2015

DE N° 14/10M 070/231

DE N° 14/10M 124/231

DE N° 14/10M 069/231



غايسيرين ل س

غايسيرول 1.80 غ، 1.20 غ، 0.72 غ

- حساسية مفرطة للغليسول أو لأحد المكونات
- متلازمة انسداد الأمعاء، نظرا للمفعول الملين للدواء
- متلازمة الأم البطن ذات المصدر غير معروف أو
- عن الالتهاب (التهاب القولون التقرحي، مرض كرون)

شكل و تقديم

تحميلة شفافة: علبه 10 تحميلات.

التركيب

للرضع	1,80 غ
	1,20 غ
	0,72 غ
سواغ	ك.ك.ل 1 تحميلة

تحذيرات

- لا يسمح بالاستعمال المطول لهذا الدواء
- عند الأطفال يجب أن تكون وصفة طبية من طريق الشرح استثنائية يجب أن تأخذ المسهلات عن بعين الاعتبار مخاطر تعرقل النشاط العادي لمنعكس التبرز
- العلاج الدوائي هو مجرد وسيلة مساعدة لنمط غذائي منتظم: يجب تعزيز التغذية بالألياف النباتية و السوائل.

دواعي الاستعمال

يستعمل هذا الدواء للعلاج العرضي للامساك في ذلك عسر التبرز أو الاستعداد لفحص المستقيم بالمنظار.

الجرعة و طريقة الاستعمال

طريقة وكيفية الاستعمال: عن طريق الشرح. التحميلة يمكن أن تنفع في الماء البارد قبل الاستعمال لتسهيل العملية. الجرعة :

في حالة الإمساك : 1 تحميلة من غليسرين ل س للكبار 5 إلى 30 دقيقة قبل الموعد المختار للتبرز ، يمكن إضافة تحميلة أخرى بعد نصف ساعة أو ساعة في حالة الإمساك الشديد.

في حالة الإمساك : الأطفال من 2 الى 6 سنوات : 1 تحميلة من غليسرين ل س للأطفال 5 الى 30 دقيقة قبل الموعد المختار للتبرز

الأطفال 6 سنوات فما فوق : 1 تحميلة من غليسرين ل س للأطفال 5 الى 03 دقيقة قبل الموعد المختار للتبرز يمكن إضافة تحميلة أخرى بعد نصف ساعة في حالة الإمساك الشديد.

في حالة الإمساك : الجرعة في حالة الإمساك هي 1 تحميلة من غليسرين ل س للرضع 5 الى 30 دقيقة قبل الموعد المختار للتبرز ، مع الانقطاع لمدة 24 ساعة كل 3 أيام.

في حالة الاستعداد لفحص المستقيم بالمنظار : لجرعة اهي 1 تحميلة من غليسرين ل س 5 الى 30 دقيقة قبل الموعد المختار للتبرز

مدة العلاج

علاج الإمساك لا يجب أن يتعدى على العموم 10 أيام.

موانع الاستعمال

في الحالات التالية

احتياطات الاستعمال
عدم استعمال هذا الدواء في حالة أزمات البواسير، شقوق الشرج والتهاب القولون التقرحي وأمراض القولون.

الحمل والرضاعة

نظرا للبيانات المتاحة هذا الدواء يجب أن يستعمل بحذر خلال فترة الحمل والإرضاع استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل الاستعمال.

التأثيرات الجانبية

الاستعمال المطول قد يؤدي إلى إحساس بحرق شرجية و التهاب المستقيم بشكل استثنائي

الجرعة المفرطة

في حالة الاستعمال المفرط أو المطول ، حدوث التهاب الشرج و إسهال شديد. يجب إيقاف العلاج أو خفض الجرعة و إعادة التوازن المائي الشاردي لمنع الجفاف.

شروط الحفظ

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25°م لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

تاريخ تحديث النشرة

سبتمبر 2015

