

# PIROXAL<sup>®</sup>

## Piroxicam 20mg



### FORME ET PRESENTATION

Suppositoire à 20mg : Boite de 10.

### COMPOSITION

Piroxicam ..... 20 mg  
Excipients : Glycérides hémi-synthétiques solides et galle de propyle ..... q.s.p. 1 suppositoire

### CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Anti-inflammatoire non stéroïdien

### INDICATIONS

PIROXAL 20mg est indiqué chez l'adulte et l'enfant à partir de 15 ans dans le traitement symptomatique :

- De l'arthrose.
- De la polyarthrite rhumatoïde ou la spondylarthrite ankylosante (affection rhumatologique de la colonne vertébrale).
- PIROXAL 20mg ne doit pas être utilisé en traitement de première intention lorsqu'un traitement par AINS est indiqué

Il ne guérit pas de l'arthrose et vous soulagera uniquement

### CONTRE INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Au-delà de 5mois de grossesse.
- Antécédents d'allergie au piroxicam ou à des substances d'activité proches telles qu'autres AINS, aspirine.
- Antécédents d'allergie aux autres constituants du suppositoire
- Prise d'anticoagulants, tels que la warfarine, empêchant la formation de caillots sanguins,
- Ulcère gastroduodénal en évolution
- Insuffisance hépatocellulaire sévère
- Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée
- Insuffisance rénale sévère
- Antécédents récents de rectites ou de rectorragies
- Enfant de moins de 15 ans

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

#### Mises en garde :

CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MEDICALE. VEUILLEZ PREVENIR VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN AVANT LA PRISE DE CE MEDICAMENT.

- Comme pour tous les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), PIROXAL 20 mg, suppositoire peut être à l'origine de graves réactions gastro-intestinales, telles que douleur, hémorragie, ulcération et perforation.
- Les médicaments tels que PIROXAL 20 mg, suppositoire pourraient augmenter le risque de crise cardiaque «infarctus du myocarde» ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée. Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.
- Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risques pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé ou si vous fumez), veuillez en parler avec votre médecin ou à votre pharmacien.
- L'administration de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien

#### Précautions d'emploi :

Il est important de prévenir votre médecin en cas :

- D'antécédents digestifs (hémorragie digestive, hernie hiatale, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),
- De maladie du cœur, du foie ou du rein,
- En cas d'anomalies ou aggravation de la fonction hépatique.

### POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie d'administration : Voie rectale

#### Posologie :

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Adultes et personnes âgées :

La dose maximale quotidienne est de 20 mg (un suppositoire) de piroxicam en une dose unique.

Votre médecin est susceptible de vous prescrire, en association avec le piroxicam, un autre médicament destiné à protéger votre estomac et votre intestin contre d'éventuels effets indésirables.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Ne pas augmenter la dose.

#### SURDOSAGE

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

#### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

L'administration simultanée de piroxicam avec les produits suivants nécessite une surveillance rigoureuse de l'état clinique et biologique du malade :

- Autres AINS (y compris l'aspirine et les autres salicylés) :
- Anticoagulants oraux
- Héparines à doses curatives ou chez le sujet âgé
- Diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC),
- Inhibiteurs de l'angiotensine II : Insuffisance rénale aigue chez le malade à risque (sujet âgé et/ou déshydraté) par diminution de la synthèse des prostaglandines rénales.
- Méthotrexate

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

##### Grossesse :

Dès le début de votre grossesse et jusqu'à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines d'aménorrhée), ce médicament ne sera utilisé que sur les conseils de votre médecin et en prise brève.

L'utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.

Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), vous ne devez EN AUCUN CAS utiliser ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.

Il peut arriver toutefois, dans des cas très particuliers que votre gynécologue vous prescrive ce médicament. Dans ce cas, respectez STRICTEMENT l'ordonnance de votre médecin.

##### Allaitement :

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.

#### CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINE

Prévenir les patients de l'apparition possible de vertiges et de somnolence.

#### EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Des réactions allergiques : éruption cutanée, démangeaisons, crise d'asthme
- Exceptionnellement, jaunisse.
- Des troubles digestifs : perte d'appétit, pesanteurs abdominales, nausées, vomissements, constipation, diarrhée, flatulences, douleurs abdominales, ballonnements.

#### CONDITIONS DE PRESCRIPTION

LISTE I

#### CONSERVATION

A conserver à température ambiante inférieure à 25 °C.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage.

Ne pas laisser ce médicament à la portée des enfants.

DE N° : 00/04B 023/231

Date de mise à jour de la notice : juillet 2018

DE N° 00/04B 023/231





# بيروكسالكام 20 مغ

- في حالة وجود تشوهات أو تفاعلات وظيفة الكبد.

## الجرعة وكيفية الاستعمال

كيفية الاستعمال:

عن طريق الشرخ

الجرعة:

من الضروري احترام الجرعة الموصى بها، في حالة شك يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي.

عند كبار السن:

الجرعة اليومية القوي 20 مغ (تحميلة) من البيروكسالكام في جرعة واحدة.

يمكن لطبيبكم أن يصف بالاشتراك مع البيروكسالكام دواء آخر يعمل على حماية

المعدة لتفادي الأعراض الجانبية المحتملة، في جميع الحالات يجب اتباع وصفة الطبيب.

لا يجب الزيادة في الجرعة.

## الجرعة المفرطة

استشر فوراً الطبيب أو الصيدلي.

## التفاعلات الدوائية

- أخير طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو قد تأخذ أي أدوية أخرى.

التناول المتزامن للبيروكسالكام مع الأدوية التالية يتطلب مراقبة دقيقة للحالة الطبية والبيولوجية للمريض:

- مضادات التهاب غير الستيرويدية الأخرى (بما في ذلك الأسبرين والساليسيلات).
- مضادات التخثر الفموية.
- الهيبارين في جرعات علاجية أو عند كبار السن.
- مدرات البول، منظمات الأنيون المحول.
- مثبط الأجيوتونسين 2: الفشل الكلوي الحاد عند المرضى المعرضين للخطر (كبار السن و / أو الذين يعانون من نقص كمية الماء في الجسم) لنقص في تركيب البروستاغلاندين الكلوي.
- ميتوتريكسات.

## الحمل والرضاعة

الحمل:

في وقت مبكر من الحمل، وتصل إلى 5 أشهر من الحمل (12-24 أسبوعاً من الحمل)،

يتم استخدام هذا الدواء إلا بنصيحة الطبيب ولمدة وجيزة.

لا ينصح استخدام هذا الدواء لفترات طويلة.

بعد 5 أشهر من الحمل (بعد 24 أسبوعاً من الحمل)، لا يجب في أي حال استعمال هذا

الدواء بسبب تأثيره على طفلك قد يكون له عواقب خطيرة في القلب والكلى، حتى

في جرعة واحدة. يمكن في حالات خاصة جداً أن يصاب أمراض النساء الخاص بك يصف

هذا الدواء. في هذه الحالة، اتباع الوصفة الطبية بدقة.

الرضاعة:

إن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية تمر في حليب الأم لذا غير مرغوب إعطاء

البيروكسالكام للمرأة المرضعة.

## قيادة المركبات أو استعمال الآلات

احتمال حدوث دوخة ونعاس قد تجعل القيادة أو استعمال الآلات خطيرة

التأثيرات غير المرغوب فيها

مثل كل الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، وإن لم يكن ذلك عند كل

الأشخاص.

- الحساسية: طفح جلدي، والحكة، وتورم الربو

- بشكل استثنائي، اليرقان.

- اضطرابات الجهاز الهضمي: فقدان الشهية، وتقل في البطن، والغثيان، والتقيؤ،

والإسهال، والانتفاخ، وآلام في البطن، والانتفاخ.

## شروط الاستطباب

قائمة 1

## شروط الحفظ

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة من 25 م°

لا يجوز استعمال هذا الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المذكور على العبوة

لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال

مقرر التسجيل رقم: 00/04B 023/231

تاريخ تحديث النشرة: جويلية 2018

## شكل و تقديم

تحميلات 20 مغ. عبلة ذات 10 تحميلات.

## التركيب

بيروكسالكام  
سواغ غليسيريدي نصف تركيبي، قالات البروبيول . . . . . لكل ل 1 تحميلة

## الفئة العلاجية

مضاد الالتهاب غير ستيرويدي.

## دواعي الاستعمال

بيروكسالكام 20 مغ مخصص للمبالغين والأطفال فوق 15 سنة في الحالات التالية:

- هشاشة العظام.
- التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب الفقار اللاصق (حالة الروماتيزم في العمود الفقري).
- في حالة استجابة العلاج بمضاد الالتهاب غير ستيرويدي اخر لا يجب استعمال بيروكسالكام 20 مغ لعلاج أولي.
- لا يعالج هشاشة العظام، انه يريح فقط.

## موانع الاستعمال

يمنع تناول هذا الدواء في الحالات التالية:

- بعد 5 أشهر من الحمل.
- فرط الحساسية ضد البيروكسالكام أو أي دواء مضاد للالتهاب غيرستيرويدي والأسبرين.
- حساسية مسبقة لأحد المكونات الأخرى لهذا الدواء.
- أخذ مضادات التخثر، مثل الوارفارين، لمنع جلطات الدم.
- قرحة المعدة أو العفج في حالة تطور

قصور كبدي حاد.

- قصور في وظيفة القلب خاصة إن كانت غير مراقبة.

- قصور كلوي حاد.

- نزيف شرخي أو التهابات شرجية.

- أطفال دون 15 سنة.

في حالة الشك، من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.

## تحذيرات واحتياطات الاستعمال

تحذيرات:

يستعمل هذا الدواء فقط تحت المراقبة الطبية.

يجرى استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

- مثل جميع الأدوية الغير الستيرويدية المضادة للالتهاب، بيروكسالكام 20 مغ تحميلة قد يسبب تفاعلات على مستوى الجهاز الهضمي مثل الألم

والنزيف والتقرح والانتفاخ.

- الأدوية مثل تحميلة بيروكسالكام 20 مغ ترفع من خطر الإصابة بأزمة قلبية

(احتشاء عضلة القلب) أو السكتة الدماغية. يكون الخطر أكثر أهمية كلما

كانت الجرعات المستخدمة كبيرة ومدة العلاج مطولة. لا يجب تجاوز الجرعات

الموصى بها أو مدة العلاج

- إذا كان لديك مشاكل في القلب، إذا كان لديك السكتة الدماغية أو إذا كنت تعتقد أن لديك عوامل الخطر لهذا النوع من الأمراض (على سبيل المثال في حالة

ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول أو إذا كنت تدخن، استشر

الطبيب أو الصيدلي.

- إن استعمال هذا الدواء يمكن أن ينجر عنه نوبات ربو وخاصة عند المرضى الذين لديهم حساسية ضد الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

## احتياطات الاستعمال

من الضروري إخبار طبيبك إذا:

- تعرضت لده في الجهاز الهضمي (نزيف، فتق حجابي، قرحة المعدة أو

الاثني عشر).

- أمراض القلب أو الكبد أو الكلى.

00/04B 023/231



حامل مقرر التسجيل، مصنع، معبئ -  
مخابر سالم - م.ص 19600 العلمة - الجزائر  
www.labosalem.com

مخابر  
سالم