

SPASMOL®

Phloroglucinol/triméthylphloroglucinol
150/150 mg



سباسمول®
فلوروغلوسينول/ تريميثيل فلوروغلوسينول
مغ 150/150

FORME ET PRESENTATION

Suppositoires : boîte de 10

COMPOSITION

Phloroglucinol 150,00 mg
Quantité correspondant en phloroglucinol anhydre à 116,70 mg
Triméthylphloroglucinol 150,00 mg
Excipients glycérides hémi-synthétiques q.s pour un suppositoire

PROPRIETES

Ce médicament est un antispasmodique musculotrope qui lutte contre les contractions anormales de l'intestin, des voies biliaires, des voies urinaires et de l'utérus. Il ne possède pas d'effet atropinique.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Utilisé dans le traitement :

- des coliques néphrétiques et des douleurs des voies urinaires,
- des coliques hépatiques et des douleurs biliaires,
- des colites spasmodiques, des douleurs intestinales,
- des douleurs des règles et des spasmes de l'utérus pendant la grossesse.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie à l'un des composants. En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie rectale. 1 suppositoire 3 fois par jour.

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions avec d'autres médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que si nécessaire, et sur les conseils de votre médecin. L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaite.

EFFETS INDESIRABLES

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner en cours de traitement des effets plus ou moins gênants. Quelques très rares réactions cutanées.

DUREE DE STABILITE

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Ce médicament doit être conservé à température ambiante entre 10°C et 25°C.

Ne jamais laisser ce médicament à portée des enfants.

DE N° : 03/10 E 039/231.

DATE DE MISE A JOUR DE LA NOTICE : Octobre 2016

شكل وتقديم

تحميلات : علبه ب 10 تحميلات

التركيب

فلوروغلوسينول 150,00 مغ
الكمية الموافقة للفلوروغلوسينول انيدر 116,70 مغ
تريميثيل فلوروغلوسينول 150,00 مغ
سواخ غليسيريدي نصف تركيبي ل ك ل 1 تحميلة

الخصائص

ن هذا الدواء مضاد للتشنجات والآلام العضلية ويمارس تأثيرات فعالة ضد التشنجات غير العادية على مستوى الأمعاء، المسالك الصفراوية، المسالك البولية والرحم. كما انه لا يملك أي مفعول اتروپيني.

دواعي الاستطباب

- يستعمل هذا الدواء في معالجة :
- مغص كلوي وآلام المسالك البولية.
 - مغص كبدي وآلام الحوصلة الصفراوية.
 - مغص تشنجي وآلام الأمعاء.
 - لام الطمث وتشنجات الرحم أثناء فترة الحمل.

مضادات الاستعمال

لا يستعمل هذا الدواء في حالة حساسية لإحدى مركباته. في حالة الشك من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.

الجرعة وكيفية الاستعمال

يستعمل عن طريق الشرج 1 تحميلة 3 مرات في اليوم. وعلى أي حال يجب التقيد بوصفة الطبيب.

احتياطات الاستعمال

ن اجل تجنب أي تداخلات وتفاعلات دوائية محتملة بين عدة أدوية من الضروري إخبار الطبيب أو الصيدلي بكل علاج متبع.

الحمل والإرضاع

لا يستعمل هذا الدواء أثناء فترة الحمل إلا إذا تطلبت الحالة وتحت نصائح الطبيب المعالج. لا يستعمل هذا الدواء أثناء فترة الإرضاع.

تأثيرات جانبية

مثل كل مستحضر فعال قد يسبب هذا الدواء عند بعض الأشخاص أثناء فترة العلاج تأثيرات نوعا ما مزعجة تتمثل في بعض حالات الحساسية الجلدية النادرة.

مدة الصلاحية

لا تتجاوز التاريخ المحدد للاستعمال كما هو مشار إليه بوضوح على الغلاف الخارجي.

كيفية الحفظ

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة ما بين 10م إلى 25م. لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

مقرر التسجيل رقم : 03/10 E 039/231.

تاريخ تحديث النشرة : أكتوبر 2016

LABORATOIRES
SALEM

Détenteur de la DE, Fabricant, Conditionneur :
Z.I. 19600 EL-EULMA - ALGERIE

www.labosalem.com



حامل مقرر التسجيل، مصنع معين :
م.ص 19600 العلمة - الجزائر

محابر
سالم

www.labosalem.com