

GYNOMIX®

Nitrate Sertaconazole 300mg



PRESENTATION

Boîte unitaire d'un ovule sous blisters thermoformés

COMPOSITION

Dans chaque ovule :

Nitrate de Sertaconazole(DCI) 300 mg
excipients : Glycérides hémysynthétiques, silice colloïdal anhydre
..... qsp 1 Ovule

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antifongique local.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est indiqué dans le traitement local des candidoses (affections dues à des champignons microscopiques) du vagin.

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez jamais GYNOMIX 300mg, ovule dans les cas suivants :

- En cas d'allergie à l'un des composants du produit ou à une substance apparentée,
- En cas d'utilisation avec les préservatifs et les diaphragmes en latex.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET MISES EN GARDE SPECIALES

Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser un savon acide pour l'hygiène locale (l'acidité favorisant la prolifération des champignons).

Ce traitement peut entraîner des sensations de brûlures locales et une augmentation des démangeaisons.

Généralement, ces phénomènes cèdent spontanément à la poursuite du traitement. Si les symptômes persistent au-delà de 24 à 48 heures, consultez votre médecin.

Mise en garde spécial :

Le traitement local de la mycose n'est qu'un élément du traitement. Pour éviter les rechutes, la recherche de facteurs favorisants par votre médecin est indispensable.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées

Préservatifs et diaphragmes en latex :

- Risque de rupture du préservatif ou du diaphragme.

Associations déconseillées

Spermicides :

- Tout traitement local vaginal est susceptible d'inactiver une contraception locale spermicide.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse :

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les

conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement :

Il n'existe pas de données sur le passage du Sertaconazole dans le lait maternel. En raison d'un passage systémique extrêmement faible, l'allaitement est possible.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Posologie :

Un ovule en administration unique, le soir au coucher.

Mode et voie d'administration :

Voie vaginale.

Introduire un ovule profondément dans le vagin, de préférence en position allongée.

Durée du traitement :

La durée du traitement est théoriquement de 1 jour.

Toutefois, en cas de persistance des signes cliniques, votre médecin pourra vous prescrire à 7 jours d'intervalle, un second ovule.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Une utilisation excessive risque d'entraîner une aggravation des effets indésirables. Si vous avez pris plus de GYNOMIX, ovule qu'il ne le fallait, et que vous sentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez consulter votre médecin.

EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES OU A UTILISER DES MACHINES

Sans objet.

EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, GYNOMIX ovule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Sensations de brûlure locale, démangeaisons sans conséquence et possibilité d'allergie.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

CONDITIONS DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tenir hors de la portée et la vue des enfants.

Durée de conservation :

Ne pas utiliser GYNOMIX ovule après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Médicament non soumis à prescription médicale.

DE N° :

Date de révision de la notice : Aout 2018

DE N°





جينوميكس[®]

سرتكونازول نيترات 300مغ

شكل و تقديم

علبة تحتوي على 1 تحميلة مهبلية

التركيب

في تحميلة مهبلية

سرتكونازول نيترات 300مغ

سواغ : غليسريد نصف تركيبي ،سيليس كولويدال أئيدر

..... كك ل تحميلة مهبلية

فئة العلاجية

مضاد موضعي للفطريات.

دواعي الاستعمال

علاج موضعي لعدوي الكونديدوز (العدوة الناجمة عن الفطريات)

للمهبل.

موانع الاستعمال

يستخدم جينوميكس 300 مغ، في الحالات التالية :

- حساسية الى أحد المكونات هذا الدواء أو مادة ذات

الصلة.

- عند استخدام الواقيات الذكرية أو أغشية اللاتكس.

في حالة الشك يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي.

احتياطات الاستعمال وتحذيرات خاصة

احتياطات الاستعمال

لا ينصح باستعمال الصابون الحمضي للتنظيف الموضعي

(الحموضة تحفز تكاثر الفطريات)

قد يسبب هذا العلاج الاحساس بالحرق لموضعي وزيادة الحكمة.

عموما، هذه الظواهر تتلاشى عند إيقاف العلاج.

إذا استمرت الأعراض بعد 24 إلى 48 ساعة، راجع طبيبك.

التحذيرات الخاصة

علاج الفطريات الموضعي ليس سوى جزء من العلاج. لتجنب

الانتكاسات، البحث عن العوامل المسببة للعدوة من طرف الطبيب

أمر ضروري.

التداخلات الدوائية

اشترك المنوع :

الواقف الذكري وأغشية اللاتكس :

- خطر تمزق الواقف الذكري أو حجاب اللاتكس.

اشترك غير الموصى به :

- المبيدات المتوية

أي علاج مهبلية موضعي قد يوقف نشاط هذا الصنف من وسائل

منع الحمل.

الحمل و الإرضاع

الحمل

ينبغي عدم استخدام هذا الدواء أثناء الحمل إلا بناء على نصيحة الطبيب. إذا اكتشفت أنك حامل أثناء فترة العلاج، يجب استشارة الطبيب الخاص بك لانه الوحيد الذي يمكن أن يقرر ضرورة مواصلة العلاج من وقفه.

الارضاع

لا توجد بيانات على مرور سرتكونازول في حليب الأم. ونظرا للعبور الجذ ضعيف للمادة الفعالة في الدم ، يمكن الارضاع عند استعمال هذا الدواء.

الجرعة ، كيفية الاستعمال

الجرعة الموصى بها :

تحميلة واحدة جرعة واحدة عند النوم.

طريقة وكيفية الاستعمال :

عن طريق المهبل.

إدخال التحميلة بعمق في المهبل، من المستحسن في وضعية مستقلة.

مدة العلاج

مدة العلاج نظرياً هي يوم واحد ومع ذلك، في حالة توصل الأعراض السريرية ، قد يصف الطبيب التحميلة الثانية بعد 7 أيام.

فرط الجرعة : الاستعمال المفرط قد يؤدي الى تفاقم الآثار الجانبية ، إذا استعمل جينوميكس أكثر من الازم ، ولاحظت آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة يرجى استشارة الطبيب.

قيادة أو استعمال الآلات : غير مطبق.

التأثيرات الجانبية

ككل الأدوية، هذا الدواء يمكن أن يتسبب في آثار جانبية عند بعض الأشخاص :

الاحساس بحرق الموضعي، والحكة ونادراً الحساسية. إذا لاحظت أي آثار جانبية غير المذكورة في هذه النشرة، أو إذا كانت الآثار الجانبية خطيرة، يرجى اعلام الطبيب أو الصيدلي.

شروط الحفظ

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 م° .

يترك بعيداً عن متناول وبصر الأطفال

مدة الحفظ

لا يستخدم جينوميكس بعد تاريخ الصلاحية المكتوب على الغلاف الخارجي .

شروط الاستطباب : يصرف بدون وصفة طبية

مقرر التسجيل رقم :

تاريخ تحديث النشرة : أوت 2018



حامل مقرر التسجيل، مصنع، معين :
مخابر سالم - م.ص. 19600 العلمة - الجزائر
www.labosalem.com

مخابر
سالم