

FENAQUENE®

Diclofénac 25 mg, 50 mg et 100 mg

FORME ET PRESENTATION

Suppositoires : Boîte de 10 suppositoires en plaques thermoformées

COMPOSITION

Diclofénac sodique 25mg
50mg
100mg

Excipients : Glycérides hémysynthétiques solides qsp 1 suppositoire.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Anti-inflammatoires, antirhumatismaux non stéroïdiens

INDICATIONS

Les indications du Fénéaquéne 25 mg et 50 mg sont limitées chez l'enfant aux rhumatismes inflammatoires infantiles. Proposé comme traitement adjuvant des manifestations inflammatoires en rapport avec le domaine ORL.

Fénéaquéne 100 mg indiqué Chez l'adulte dans le traitement symptomatique des rhumatismes inflammatoires, de l'arthrose, des arthrites et tendinites, des lombalgies, sciatiques et cruralgies.

CONTRE-INDICATIONS

- Au-delà de 5 mois de grossesse révolue.
- En cas d'antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou un anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine),
- Si vous êtes allergique au diclofénac sodique ou à l'un des excipients,
- En cas d'antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS.
- En cas d'ulcère d'estomac ou du duodénum ancien en évolution ou récidivant.
- En cas d'hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours.
- En cas de maladie grave du foie.
- En cas de maladie grave du rein.
- En cas de maladie cardiaque et/ou de maladie vasculaire cérébrale avérée.
- En cas d'antécédents de troubles de la circulation sanguine.
- En cas d'inflammations ou saignements récents du rectum.
- Nourrisson de moins de 1 an.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Mises en garde :

Informez votre médecin si :

- vous êtes diabétique.
- vous avez une angine de poitrine, une insuffisance cardiaque, des problèmes artériels, des caillots sanguins, une pression artérielle élevée, un cholestérol élevé ou des triglycérides élevés.
- vous avez des antécédents d'allergie.
- vous avez de l'asthme, des inflammations à répétition du nez ou des sinus une maladie des bronches ou une infection des voies respiratoires.
- vous avez ou avez eu dans le passé des problèmes digestifs
- vous souffrez d'une maladie du foie ou du rein.
- vous êtes enceinte ou que vous envisagez une grossesse.

Précautions d'emploi

Au cours de traitement prolongé, il est recommandé de contrôler la forme sanguine, les fonctions hépatique et rénale.

POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie d'administration : Voie rectale.

Posologie :

Chez l'enfant : Fénéaquéne 25 mg est indiqué chez l'enfant de plus de 16 kg ;

La dose recommandée dépend de son poids. Elle est généralement de

2 à 3 mg/kg par jour, à répartir en 2 à 3 prises, soit à titre indicatif : 1 suppositoire à 25 mg, 2 à 3 fois par jour, Ou 1 suppositoire de Fénéaquéne 50 mg par jour.

Conformez-vous à la prescription de votre médecin.

Chez l'adulte :

- Traitement d'attaque : 150 mg par jour en 2 prises, soit 1 suppositoire à 100 mg à compléter avec une forme orale à 50 mg.
- Traitement d'entretien : 1 suppositoire à 100 mg par jour le soir au coucher.

Durée d'administration :

L'utilisation de la voie rectale doit être la plus courte possible en raison de la toxicité locale surajoutée aux risques par voie orale.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

Soyez prudent, la prise de FENAQUENE 100MG, suppositoire, peut entraîner des vertiges, une somnolence et des troubles de la vue

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse : Jusqu'à 5 mois de grossesse révolue ; si nécessaire ; votre médecin pourra vous prescrire ce médicament ; au-delà de 5 mois ; vous ne devez en aucun cas prendre ce médicament.

Allaitement : Ce médicament passe dans le lait maternel. Il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

1/ Associations déconseillées

- Anticoagulants oraux : augmentation du risque hémorragique de l'anticoagulant oral
- Héparines : augmentation du risque hémorragique (inhibition de la fonction plaquettaire).

2/ Associations nécessitant des précautions d'emploi.

- Diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion : insuffisance rénale aiguë chez le malade déshydraté (diminution de la filtration glomérulaire par inhibition des prostaglandines rénales).

3/ Associations à prendre en compte.

- Bêta-bloquants : réduction de l'effet antihypertenseur (par inhibition des prostaglandines rénales).
- Ciclosporine : risque d'addition des effets néphrotoxiques.

EFFETS INDESIRABLES

- Tractus gastro-intestinal : douleurs épigastriques occasionnelles, nausées, vomissements, diarrhées, crampes abdominales, dyspepsie, flatulence, anorexie. Irritation locale due à la forme suppositoire. Rarement : hémorragie gastro-intestinale (hématemèse, méléna, diarrhées avec présence de sang). Ulcère gastro-intestinal avec ou sans hémorragie ou perforation.
- Foie : augmentation des transaminases sériques (SGOT, SGPT). Rarement : hépatite accompagnée ou non d'ictère. Dans des cas isolés, hépatite fulminante.
- Hypersensibilité. Rarement : réactions d'hypersensibilité telles que l'asthme, réactions générales anaphylactiques/anaphylactoïdes, y compris hypotension.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

A conserver à température inférieure à 25°C

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage. Ne jamais laisser ce médicament à la portée des enfants.

CONDITIONS DE DELIVRANCE

Liste II

D.E. FENAQUENE 25 mg : 04/04B 008/231.

D.E. FENAQUENE 50 mg : 07/04B 046/231.

D.E. FENAQUENE 100 mg : 00/04B 009/231.

Date de mise à jour de la notice : février 2018.

D.E. N° 00/04B 009/231

D.E. N° 07/04B 046/231

D.E. N° 04/04B 008/231



فناكان

ديكلوفيناك 25 مغ، 50 مغ، 100 مغ

شكل و تقديم

تحميلات: علبه ب 10 تحميلات

التركيب

ديكلوفيناك صوديوم 25 مغ

مغ 50

مغ 100

سواغ : غليسيريدي نصف تركيبي لكل ل 1 تحميله

الفئة العلاجية

مضادات الالتهابات والروماتيزم غير الستيرويدية

دواعي الاستعمال

يستعمل فناكان 25 مغ و50 مغ عند الأطفال في علاج الالتهابات الروماتيزمية. ويؤخذ أيضا كعلاج مساعد لأعراض الالتهابات الخاصة بجهز الأنف والأذن والحنجرة. يستعمل فناكان 100 مغ عند الكبار كعلاج ضد الالتهابات الروماتيزمية والتهاب المفاصل، الالتهابات الوترية، ألم الظهر، عرق النسا و كوراجليا.

موانع الاستعمال

ما بعد 5 أشهر من الحمل.

- إذا كان لديك سوابق حساسية أو ربو ناجم عن تناول هذا الدواء أو

مضادات الالتهابات غير الستيرويدية، حامض الأسيتيل

ساليسيليك (الأسبرين)،

- إذا كان لديك حساسية من ديكلوفيناك الصوديوم أو أي من

المكونات الأخرى،

- في حالة وجود سوابق نزيف في الجهاز الهضمي أو قرحة ناتجة

عن علاج سابق بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

- في حالة قرحة المعدة أو الاثني عشر في تطور أو سابقة.

- في حالة نزيف الجهاز الهضمي، نزيف دماغي أو نزيف آخر

مستمر.

- في حالة أمراض الكبد الخطيرة.

- في حالة مرض الكلى الحاد.

- في حالة مرض القلب أو أمراض دماغية وعائية.

- في حالة وجود سوابق اضطرابات الدورة الدموية.

- في حالة التهاب أو نزيف المستقيم.

- الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

تحذيرات وإحتياطات الاستعمال

تحذيرات

أخبر طبيبك إذا:

- كنت مصاب بالسكر.

- لديك الديدمة الصدرية، وفشل القلب، ومشاكل الشرايين، جلطات

الدم، وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول أو الدهون الثلاثية

العالية.

- لديك تاريخ من الحساسية.

- لديك الربو، والتهابات متكررة من الأنف أو الجيوب الأنفية، وأمراض

الشعب الهوائية أو عدوى الجهاز التنفسي.

- لديك أو كان لديك في الماضي مشاكل في الجهاز الهضمي.

- لديك مرض في الكبد أو الكلى.

- كنت حاملًا أو تخططين للحمل.

إحتياطات الإستعمال:

أثناء العلاج لفترات طويلة، من المستحسن التحقق من الصيغة

الدموية وظائف الكبد والكلى

الجرعة وطريقة الاستعمال

طريقة الاستعمال:

عن طريق الشرج

الجرعة:

عند الأطفال:

- يستعمل فناكان 25 مغ عند الأطفال الأكثر من 16 كغ.

- الجرعة الموصى بها تعتمد على وزن الطفل، وعادة ما يكون من 2 إلى 3 مغ/كغ في اليوم مقسمة من 2 إلى 3 مرات إما كمؤشر: تحميله 25 مغ من 2 إلى 3 مرات، أو تحميله من فناكان 50 مغ في اليوم، في جميع الحالات التزم بوصفة طبيبك.

عند البالغين:

- علاج الهجوم: 150 مغ يوميا في جرعتين، أي تحميله 100 مغ

مستكملة بجرعة 50 مغ عن طريق الفم.

- معالجة الصبابة: تحميله 100 مغ يوميا عند النوم.

مدة الاستعمال:

استعمال التحميلات يجب أن يكون على أقصر مدة ممكنة بسبب

احتمال حدوث تسمم موضعي بالإضافة إلى أعراض الاستعمال عن طريق الفم.

قيادة المركبات واستعمال الآلات

كّن حذرا، مع أخذ فناكان 100مغ تحميله، قد يؤدي إلى الدوخة، والتعاس،

واضطرابات بصرية

الحمل والأرضاع

الحمل:

إلى حد 5 أشهر من الحمل؛ إذا لم؛ قد يصف لك الطبيب هذا الدواء؛

بعد 5 أشهر؛ يمنع تناول هذا الدواء.

الأرضاع:

هذا الدواء يمر في حليب الأم، وينبغي تجنب استعماله أثناء الرضاعة. من الضروري

استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

تداخلات الأدوية

1/ الاستعمالات الغير موصى بها

- مضادات تخثر الدم عن طريق الفم: زيادة خطر النزيف.

- هيبارين: زيادة خطر النزيف (تثبيط وظيفة الصفائح الدموية).

2/ الاستعمالات التي تتطلب الاحتياطات اللازمة

- مدرات البول، ومثبطات الأزيم المحول: الفشل الكلوي الحاد عند

المريض الذي يعاني من نقص السوائل في الجسم (انخفاض

التصفية الكلوية بتثبيط البروستاغلاندينات الكلوية).

3/ الاستعمالات التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار

- حاصرات بيتا: الحد من تأثير ارتفاع ضغط الدم (عن طريق تثبيط

البروستاغلاندينات الكلوية).

- سيكلوسبورين: خطر التسمم الكلوي.

تأثيرات جانبية

الجهاز الهضمي: ألم عرضي في المنطقة فوق المعدية، غثيان، تقيؤ،

إسهال، تشنجات البطن، عسر الهضم، انتفاخ البطن، فقدان الشهية، وتهيج

موضعي بسبب استعمال التحميلات. نادرا، نزيف الجهاز الهضمي

(هيماتيمس، ميلينسا، الإسهال مع الدم)، قرحة الجهاز الهضمي مع أو بدون

نزيف أو ثقب.

الكبد: زيادة في الترانساميناسات في الدم. نادرا: التهاب الكبد مع أو بدون

اليرقان. في حالات معزولة، قصور كبدى حاد.

الحساسية: نادرا ردود فعل فرط الحساسية مثل الربو، ردود فعل الحساسية /

الحساسية المفرطة العامة، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم.

شروط الحفظ

يحفظ هذا الدواء في درجة دون 25°م.

لا يجب تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المشار إليه بوضوح على التعبئة.

لا تترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

شروط الاستطباب: قائمة 2

مقرر التسجيل رقم

فناكان 25 مغ : 04/04B 008/231

فناكان 50 مغ : 07/04B 046/231

فناكان 100 مغ : 00/04B 009/231

تاريخ تحديث النشرة: فيفري 2018



حامل مقرر التسجيل، مصنع معين :
مخابر سالم - م.ص 19600 العالمة - الجزائر
www.labosalem.com

مخابر
سالم

D.E.N° 04/04B 008/231

D.E.N° 07/04B 046/231

D.E.N° 00/04B 009/231

