



# LIDOCAÏNE LS®

## Chlorhydrate de Lidocaïne 2%



### FORME ET PRESENTATION

Gel oral, tube de 100g.

### COMPOSITION

Chlorhydrate de Lidocaïne ..... 2,14 g  
 Qté correspondante en chlorhydrate de lidocaïne anhydre ..  
 ..... 2,00g  
 Excipients ..... q.s.p. un tube de 100g  
 Excipient à effet notoire ..... Parahydroxybenzoate.

### CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Anesthésique local.

### INDICATIONS THERAPEUTIQUES

La Lidocaïne LS 2% est un anesthésique local indiqué chez les adultes :

- Dans le traitement des douleurs de la bouche, de l'œsophage ou de l'estomac
- En anesthésie locale avant explorations instrumentales du tube digestif.

### CONTRE-INDICATIONS

- Chez l'enfant.
- Réactions allergiques à la lidocaïne ou aux parahydroxybenzoates de méthyle ou propyle.
- Porphyries (maladies génétiques, héréditaires atteignant la fabrication de l'hémoglobine).
- Epilepsie non contrôlée par un traitement.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

### MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

#### Mises en garde :

Ce médicament entraîne une anesthésie de l'arrière gorge et peut faciliter les « fausses routes » (passage des aliments dans le larynx) et des morsures graves de la langue et des joues. Eviter toute alimentation solide ou liquide pendant 2 heures.

#### Précautions d'emploi :

- Tenir compte d'un risque de passage dans le sang plus rapide et plus important de la lidocaïne en cas de lésion des muqueuses.
- Eviter de faire l'anesthésie dans une zone infectée ou inflammée.

### POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

#### Posologie :

La Lidocaïne LS 2% est un médicament réservé à l'adulte.

#### Douleur buccale ou œsogastrique :

1 cuillère à dessert ou 1 cuillère à soupe par prise au moment des douleurs, sans dépasser 3 prises par jour.

En cas de douleurs de l'œsophage ou de l'estomac, il faut prendre rapidement un demi-verre d'eau suite à la prise de ce médicament afin d'éviter l'anesthésie des muqueuses buccales et de la glotte.

#### Explorations instrumentales :

1 cuillère à dessert ou 1 cuillère à soupe, répartir avec la langue le produit dans la cavité buccale et avaler lentement sans prendre d'eau.

Attendre 2 heures avant toute ingestion.

#### Voie d'administration :

Voie orale

### Durée du traitement :

Se conformer à la prescription médicale.

### SURDOSAGE

Dans les conditions normales d'utilisation, aucun effet de surdosage n'a été rapporté.

Dans les cas où une dose supérieure aux doses préconisées était administrée, des manifestations de toxicité neurologiques ou cardiovasculaires peuvent apparaître.

### SPORTIFS

Attention, ce médicament contient de la lidocaïne qui est inscrite sur la liste des substances dopantes.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

#### Grossesse :

Ce médicament peut être utilisé au cours de la grossesse quel qu'en soit le terme.

#### Allaitement :

L'allaitement est possible au décours d'une anesthésie locale des muqueuses de la bouche.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES

Il est recommandé de ne pas conduire dans les heures suivant l'utilisation de ce médicament.

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament doit être utilisé avec précaution et sous surveillance étroite chez les patients recevant d'autres anesthésiques locaux ou certains antiarythmiques en raison d'une majoration de la toxicité.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, la Lidocaïne LS 2% est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Les réactions allergiques (choc anaphylactique dans les cas les plus sévères) aux anesthésiques locaux à liaison amide sont rares.
- Des réactions toxiques, témoignant d'une concentration anormalement élevée d'anesthésique local dans le sang, peuvent apparaître soit immédiatement dû à un passage intraveineux accidentel, soit plus tardivement dû à l'utilisation d'une trop grande quantité d'anesthésique.

### CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

LISTE II : Uniquement sur ordonnance

### CONSERVATION

- Conserver à une température ne dépassant pas 25°C dans son emballage d'origine.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

DE N° : 21/02C 027/231

Date de mise à jour de la notice : Février 2021



DE N° 21/02C 027/231



# ليدوكاين ل س<sup>®</sup>

## كلورهيدرات الليدوكاين 2%



### طريقة الإستعمال

يستعمل عن طريق الفم.

### مدة العلاج

الامتثال للوصفة الطبية.

### الجرعة المفردة

في ظروف الإستخدام العادية، لم يتم الإبراز عن أي آثار جرعة زائدة.

في الحالات التي يتم فيها أخذ جرعة أكبر من الجرعات الموصى بها، قد تظهر أعراض السمية العصبية أو السمية القلبية.

### الرياضيون

تحذير، يحتوي هذا الدواء على الليدوكاين والمسجلة ضمن قائمة المواد المنشطة.

### الحمل والارضاع

#### الحمل:

يمكن استخدام هذا الدواء في جميع مراحل الحمل.

#### الارضاع:

الرضاعة الطبيعية ممكنة بعد التخدير الموضعي للأغشية المخاطية للفم.

استشر الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

### القيادة و استخدام الآلات

يوصى بعدم القيادة خلال الساعات الموالية من اخذ هذا الدواء.

### التداخلات الدوائية

يجب استعمال هذا الدواء بحذر و تحت مراقبة دقيقة لدى المرضى اللذين يستعملون تخدير موضعي آخر أو بعض مضادات عدم انتظام ضربات القلب بسبب زيادة السمية. إذا كنت تتناول أو تناولت أي أدوية أخرى مؤخرًا، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلي.

### الأعراض الجانبية

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يكون للليدوكاين ل س 2% آثارًا جانبية، على الرغم من أن الجميع لا يصاب بها:

- ردود فعل حساسية نادرة لمخدر موضعي بروابط أميد (صدمة حساسية في أشد الحالات).

- يمكن أن تظهر التفاعلات السمية، التي تشير إلى تركيز عال بشكل غير طبيعي بسبب استخدام كميات كبيرة من المخدر.

### شروط الاستطباب

القائمة II: لا يصرّف إلا بوصفة طبية.

### شروط الحفظ

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية في علبته الأصلية.

يحفظ بعيدا عن متناول وعن نظر الأطفال.

لا يجب تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العلبة الخارجية.

مقرر التسجيل رقم: 21/02C 027/231

تاريخ تحديث النشرة: فيفري 2021

### شكل وتقديم

جال عن طريق الفم، أنبوب 100 غ.

### التركيب

كلورهيدرات الليدوكاين ..... 2,14 غ

الكمية المعادلة لكلورهيدرات الليدوكاين هانيدر ..... 2,00 غ

سوغ ..... ك.ك.لأنبوب 100 غ

سوغ ذو تأثير ملحوظ ..... باراهيدروكسي بنزوات.

### الفئة العلاجية

مخدر موضعي.

### دواعي الاستعمال

الليدوكاين ل س 2% مخدر موضعي مخصص للكبار يستعمل في:

- علاج آلم الفم، المريء أو المعدة.

- التخدير الموضعي قبل الفحوصات الاستكشافية للجهاز الهضمي.

### موانع الاستعمال

- عند الأطفال.

- حساسية لليدوكاين أو للباراهيدروكسي بنزوات الميثيل

أو البروبيل.

- البورفيريا (الأمراض الوراثية التي تؤثر على إنتاج الهيموغلوبين).

- الصرع الغير معالج.

في حالة الشك، من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال هذا الدواء.

### احتياطات الاستعمال وتحذيرات خاصة

#### تحذيرات:

هذا الدواء يسبب تخدير في الجزء الخلفي من الحلق ويمكن أن يسهل الطريق الخطأ (مرور المواد الغذائية عن طريق القصبة الهوائية) و القضم الإلرادي.

تجنب أي تغذية صلبة أو سائلة لمدة ساعتين.

#### احتياطات الاستعمال:

- يجب الأخذ بعين الاعتبار خطر مرور الليدوكاين بشكل أسرع

وأكبر إلى الدم في حالة حدوث تلف للأغشية المخاطية.

- تجنب تخدير المناطق المصابة أو الملتتهبة.

### الجرعة وطريقة الاستعمال

الجرعة: الليدوكاين ل س 2% مخصص للكبار

آلم الفم، المريء أو المعدة:

ملعقة صغيرة (ملعقة تحلية) أو ملعقة كبيرة (ملعقة عشاء) وقت الآلام دون

تجاوز 3 جرعات في اليوم، في حالة آلام في المريء أو المعدة، يجب أخذ

نصف كوب من الماء بسرعة لتجنب تخدير الغشاء المخاطي للفم و اللهاة.

في حالة الفحوصات الاستكشافية

ملعقة صغيرة (ملعقة تحلية) أو ملعقة كبيرة (ملعقة عشاء).

توزع باللسان في تجويف الفم و تبلع ببطء دون اخذ الماء.

انتظر ساعتين قبل الأكل.

رقم التسجيل: 21/02C 027/231



حامل مقرر التسجيل، مصنع معين:  
مخابر سالم - ف.ص. 19600 العلمة - الجزائر  
[www.labosalem.com](http://www.labosalem.com)

مخابر  
سالم