

Lowgas[®]

Siméticone - 125 mg



FORME ET PRESENTATION

Ce dispositif médical se présente sous forme de gélules : boîte de 30 gélules.

COMPOSITION

Siméticone 125 mg.
Excipients q.s.p. 1 Gélule.

PROPRIETES

LOWGAS est un dispositif médical à base de siméticone, qui a une action physique et mécanique connue pour soulager des problèmes gastro-intestinaux provoqués par l'excès de gaz.

La siméticone est une substance physiologiquement inerte qui n'a pas d'activité pharmacologique, elle agit en modifiant la tension superficielle des bulles de gaz piégées dans le tractus gastro-intestinal provoquant ainsi leur coalescence (fusion), et facilite leur élimination.

INDICATION

LOWGAS est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans pour le traitement symptomatique des gênes gastro-intestinales telles que : les éructations, les ballonnements et les flatulences, les gonflements ou pesanteur abdominale.

LOWGAS donne une sensation de satiété précoce et de ventre plat.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la Siméticone ou à l'un des excipients.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Lowgas est déconseillé :

- Chez les enfants de moins de 6 ans ;
- En cas de constipation prolongée ;
- En cas de problèmes d'estomac persistants ou inexpliqués ;

Si les symptômes s'aggravent, informez-en votre médecin.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Posologie

1 gélule jusqu'à 3 fois par jour pendant ou après les principaux repas et, si nécessaire, avant le coucher.

Arrêter le traitement dès la disparition des symptômes. Lowgas ne doit pas être utilisé pendant plus de 30 jours sans avis médical.

Mode d'administration

Voie orale.

Les gélules doivent être avalées avec un grand verre d'eau.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Lowgas peut être utilisé chez les femmes enceintes ou qui allaitent compte tenu de l'absence d'absorption digestive de la siméticone.

Demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser Lowgas.

EFFETS INDESIRABLES

Les effets indésirables de la siméticone rapportés sont très rares ; cependant il a été observé dans certains cas l'apparition des nausées, des vomissements, de constipation, d'éruption cutanée et des réactions d'hypersensibilité.

CONDITIONS DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C dans son emballage d'origine.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

DISPOSITIF MEDICAL

Classe : Ila

D.H N° : ط ρ Classe Ila/018/22

Date de mise à jour de la notice : Mai 2022.

D.H N° : ط ρ Classe Ila/018/22





لوغاز^ع

سيميتيكون - 125مغ

الجرعة و طريقة الاستعمال

الجرعة
كبسولة واحدة حتى 3 مرات في اليوم، تؤخذ أثناء أو بعد الوجبات الرئيسية، و قبل النوم إذا لزم الأمر.
يجب التوقف عن العلاج بمجرد اختفاء الأعراض.
لا ينبغي استعمال لوغاز لأكثر من 30 يوم دون استشارة طبية.
طريقة الاستعمال
عن طريق الفم.
يجب أخذ الكبسولات مع كوب كبير من الماء.

الحمل و الإرضاع

يمكن استخدام لوغاز في حالة الحمل أو الإرضاع، نظرا لعدم امتصاص السيميتيكون في الجهاز الهضمي.
ينصح باستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام لوغاز.

الأعراض الجانبية

الآثار الجانبية للسيميتيكون المبلغ عنها نادرة جدا، لكنه لوحظ في بعض الحالات ظهور غثيان، تقيؤ، إمساك، طفح جلدي و فرط الحساسية.

شروط الحفظ

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية داخل علبته الأصلية.
يحفظ بعيدا عن متناول و عن نظر الأطفال.
لا يجب تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العلبة الخارجية.

جهاز طبي

الصف: IIa

رقم مقرر المصادقة : Classe IIa/018/22 م ط
تاريخ تحديث النشرة : ماي 2022

شكل و تقديم

يقدم هذا الجهاز الطبي على شكل كبسولات : علبة تحتوي على 30 كبسولة.

التركيب

سيميتيكون 125 مغ
سوغ 1 ك.ك.ل 1 كبسولة

الخصائص

لوغاز عبارة عن جهاز طبي ذو تأثير فيزيائي و ميكانيكي معروف بأنه يخفف مشاكل الجهاز الهضمي الناتجة عن الغازات الزائدة.
السيميتيكون مادة خاملة فسيولوجيا و ليس لها نشاط دوائي، تعمل على تعديل التوتر السطحي لفقاعات الغاز المحتجزة في الجهاز الهضمي مما يؤدي الى اندماجها، و بالتالي تسهيل إخراجها.

دواعي الاستعمال

يستخدم لوغاز عند الكبار و الأطفال الأكثر من 6 سنوات لعلاج أعراض عدم الارتياح في الجهاز الهضمي مثل : التجشؤ، الانتفاخ، الشعور بالثقل في البطن.
يمنح لوغاز الشعور بالشبع المبكر و الإحساس ببطن مسطح.

موانع الاستعمال

فرط الحساسية اتجاه السيميتيكون أو لأحد السوغ.

تحذيرات و احتياطات الاستعمال

لا ينصح باستعمال لوغاز :
- عند الأطفال الأقل من 6 سنوات ؛
- في حالة الإمساك لفترات طويلة ؛
- في حالة وجود مشاكل مستمرة أو غير مفسرة بالمعدة ؛
إذا ساءت الأعراض، أخبر طبيبك.



حامل و مستغل مقرر المصادقة ، مصنع (إنتاج و تحرير) :
ش.ذ.م.م. مخابر سالم م.ص. العلة 19600 - الجزائر
www.labosalem.com

مخابر
سالم