



SEREXON®

Extrait lipido stérolique de *Serenoa repens* 160 mg



FORME ET PRESENTATION

Ce médicament se présente sous forme de gélule. Boîte de 60 gélules.

COMPOSITION

Extrait lipido stérolique de *Serenoa repens* (extrait de palmier de Floride) 160 mg
Excipients q.s.p. 1 gélule

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Médicament à base de plantes utilisé dans l'hypertrophie bénigne de la prostate.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate.

POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Posologie :

Réservé à l'homme adulte.

La dose usuelle est de 2 gélules par jour, à prendre au moment des repas avec un verre d'eau.

Respectez toujours la posologie prescrite.

Mode d'administration :

Voie orale.

Durée du traitement :

La durée maximale du traitement est limitée à 6 mois.

CONTRE INDICATIONS

Ne prenez jamais SEREXON 160 mg en cas d'hypersensibilité à la substance active (l'extrait de palmier de Floride) ou à l'un des autres composants de ce médicament.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET MISES EN GARDE SPECIALES

Faites attention avec SEREXON 160 mg :

- La prise de ce médicament à jeun peut parfois provoquer des nausées.
- Pendant votre traitement, votre médecin continuera à surveiller régulièrement votre prostate. En aucun cas, SEREXON 160 mg, gélule ne pourra remplacer une intervention chirurgicale lorsque celle-ci s'avère nécessaire.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES FORMES D'INTERACTIONS

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

FERTILITE, GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ce médicament n'est pas destiné à la femme.

EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES

Sans objet.

EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, SEREXON 160 mg est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Effets indésirables fréquents :

- Des maux de tête,
- Des douleurs abdominales.

Effets indésirables peu fréquent :

- Des nausées,
- Une augmentation des gamma-glutamyltransférases et une augmentation modérée des transaminases,
- Un rash cutané,
- Un développement anormal des seins chez l'homme (gynécomastie), réversible à l'arrêt du traitement.

Effets indésirables non estimable :

- Des œdèmes,
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

SURDOSAGE

Symptômes :

Si vous avez pris plus de SEREXON 160 mg que vous n'auriez dû des troubles gastro-intestinaux passagers (douleur abdominale) peuvent survenir.

Conduite d'urgence et antidote :

En cas de surdosage ou d'ingestion accidentelle : consultez votre médecin ou votre pharmacien.

INCOMPATIBILITES

Sans objet.

DUREE ET CONDITIONS DE CONSERVATION

- Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.
- A conserver à une température ne dépassant pas 25°C dans son emballage d'origine.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

NATURE ET CONTENU DE L'EMBALLAGE EXTERIEUR

Plaquettes thermoformées (PVC/PVDC transparent /Aluminium) conditionnées dans un étui en carton.

PRECAUTIONS PARTICULIERES D'ELIMINATION ET DE MANIPULATION DES MEDICAMENTS UTILISES OU DES DECHETS DERIVES DE CES MEDICAMENTS, LE CAS ECHEANT

Sans objet.

CONDITIONS DE DELIVRANCE

Médicament non soumis à prescription médicale.

NOM ET ADRESSE DU DETENTEUR ET L'EXPLOITANT DE LA D.E

SARL Laboratoires SALEM, zone industrielle El Eulma 19600 - Algérie.

NOM ET ADRESSE DES DIFFERENTS INTERVENANTS DANS LA FABRICATION DU PRODUIT FINI (PRODUCTION ET LIBERATION)

SARL Laboratoires SALEM, zone industrielle El Eulma 19600 - Algérie.

NUMERO DE LA DECISION D'ENREGISTREMENT

19/25 B 006/231

DATE DE MISE A JOUR DE LA NOTICE

Octobre 2022.



D.E.N° 19/25 B 006/231



DÉTENTEUR ET EXPLOITANT DE LA DE, FABRICANT (PRODUCTION ET LIBÉRATION)
SARL Laboratoires SALEM Z.I. El Eulma 19600 - Algérie.
www.labosalem.com





سيريكسون®

مستخلص ذهني ستيرولي لسيرينواريننس 160 مغ

شكل و تقديم

يقدم هذا الدواء على شكل كبسولات. تحتوي العبوة على 60 كبسولة.

التركيب

مستخلص ذهني ستيرولي لسيرينواريننس (مستخلص نخيل فلوريدا) 160مغ
سواغ ك.ك.ل 1 كبسولة

الفئة العلاجية

مستخلص نباتي يستخدم في علاج التضخم الحميد للبروستات.

دواعي الاستعمال

يوصى هذا الدواء في علاج بعض اضطرابات التبول المتعلقة بالتضخم الحميد للبروستات.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الجرعة :

مخصص للرجل البالغ.

الجرعة المعتادة هي كبسولتان في اليوم ، تؤخذ وسط الأكل مع كأس من الماء.
يجب احترام الجرعة الموصوفة.

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم.

مدة العلاج :

المدة القصوى للعلاج محددة ب 6 أشهر.

موانع الاستعمال

يمنع استعمال سيريكسون 160 مغ في حالة حساسية للمادة الفعالة (مستخلص نخيل فلوريدا) أو لأحد المكونات الأخرى لهذا الدواء.

احتياطات الاستعمال وتحذيرات خاصة

يجب الانتباه عند استعمال سيريكسون 160 مغ :

- في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدي تناول هذا الدواء على معدة فارغة إلى حدوث غثيان.

- أثناء العلاج سيواصل طبيبك مراقبة البروستات بانتظام. لا يمكن لسيريكسون 160 مغ تحت أي ظرف من الظروف أن يعوض الجراحة إذا أثبتت ضرورتها.

التداخلات الدوائية و التداخلات الأخرى

إذا كنت تتناول أو تتناولت مؤخرا أدوية أخرى ، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية ، فاستشر طبيبك أو الصيدلي.

الخصوبة ، الحمل و الإرضاع

هذا الدواء ليس مخصصا للنساء.

التأثير على قدرة قيادة المركبات و استخدام الآلات

لا ينطبق.

الأعراض الجانبية

مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يسبب سيريكسون 160 مغ أعراضا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.

أعراض جانبية شائعة :

- الآم الرأس ،

- الآم في البطن.

أعراض جانبية قليلة الشبوع :

- غثيان ،

- زيادة الغاما غلوتاميل ترانسفيراز و زيادة معتدلة في الترانساميناز ،

- طفح جلدي ،

- زيادة غير طبيعية في حجم الثدي عند الرجال (الثدي) ، يزول الثدي عند التوقف عن العلاج.

أعراض جانبية ذات تردد غير مقرر :

- وذمة (تورم في الجلد) ،

- إذا لوحظ أي أثر جانبي غير مذكور على هذه النشرة ، أو إذا زادت

خطورة الأعراض الجانبية ، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

الجرعة المفردة

الأعراض :

إذا تناولت أكثر من الجرعة المحددة من سيريكسون 160 مغ ، قد تحدث لك اضطرابات عابرة في الجهاز الهضمي (آلام في البطن).

إجراءات الطوارئ و الترتيبات :

في حالة الإفراط في الجرعة أو التسمم عن طريق الخطأ؛ استشر طبيبك أو الصيدلي.

عدم التوافق

لا ينطبق.

مدة و شروط الحفظ

- لا يجب تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة الخارجية.

- يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية في علبته الأصلية.

- يحفظ بعيدا عن متناول و عن نظر الأطفال.

طبيعة و محتوى الغلاف الخارجي

صفائح مشكلة حراريا (بولي فينيل كلوريد / بولي فينيلدين كلوريد الشفاف / ألومنيوم) معبأة داخل علبة من الورق المقوى.

احتياطات خاصة للتخلص و التعامل مع الأدوية

المستعملة أو النفايات الناتجة عنها ، إذا لزم الأمر

لا ينطبق.

شروط الصرف

يصرف بدون وصفة طبية.

اسم و عنوان حامل و مستغل مقرر التسجيل

ش.ذ.م.م. مخابر سالم المنطقة الصناعية العلمة 19600 - الجزائر.

اسم و عنوان مختلف الأطراف المشاركة في تصنيع

المنتج النهائي (إنتاج و تحرير)

ش.ذ.م.م. مخابر سالم المنطقة الصناعية العلمة 19600 - الجزائر.

رقم مقرر التسجيل

19/25 B 006/231

تاريخ تحديث النشرة

أكتوبر 2022.

حامل و مستقل مقرر التسجيل ، مصنع (إنتاج و تحرير) :

ش.ذ.م.م. مخابر سالم م.ص. العلمة 19600 - الجزائر.

www.labosalem.com



رقم التسجيل: 19/25 B 006/231